



Rédigé par l'équipe algologique
du CHA-Vivalia

→ Distinctions et particularités des médicaments à action rapide et action retard

	Libération rapide	Libération retard
Indications thérapeutiques	Titration et interdoses Douleur aiguë / Accès douloureux paroxystiques Douleur induite par les soins	Douleur de fond
Délai d'action	Environ 30 min	Comprimé: 2 à 4h Patch: 12h
Durée d'action	4 à 6h	12h
Sécable ?	Peut être coupé en 2	Les comprimés restent NON sécables et NON écrasables. Les gélules peuvent être ouvertes et intégrées à un repas ou à une sonde gastrique.
Ecrasable?	Peut être écrasé	
Equivalences	1 C° de MS Direct 10mg = 1 C° d'Oxynorm instant 5mg = 1 C° de Tradonal 50mg	1 C° de MS Contin 10mg = 1 C° d'Oxycontin 5mg = 1 C° de Tradonal retard 50mg ! Patch = tjs libération prolongée

→ Quelques situations à ne pas reproduire et déjà rencontrées dans notre pratique :

- > Administration de deux doses à libération retard dans un intervalle de 06h.
- > Lors d'une douleur aiguë, le patient a reçu une dose à libération retard alors que son délai d'action est de min 2h.
 - > Patient porteur d'une sonde gastrique qui reçoit un comprimé à libération retard qui a été écrasé.
- > S'assurer de la prise des antalgiques à heure, surtout à libération retard. Donc ne pas les laisser sur la table de nuit.