

Une meilleure utilisation du patch d'opioïdes (Fentanyl / Buprénorphine)



Rédigé par l'équipe algologique du CHA-Vivalia

Le patch de Fentanyl ou de Buprénorphine est un dispositif posé sur la peau. Il est destiné à libérer la molécule dans la circulation sanguine (à travers la peau) pendant 72 heures.

Ce traitement est utilisé pour traiter la douleur prolongée modérée à intense nécessitant des analgésiques puissants.

Comment débiter un traitement par patch ?

- > Le patch n'agit qu'au bout de 12h. Par conséquent, garder le traitement en cours pendant ces 12 premières heures avant de l'arrêter.
- > Le dosage choisi se fera en se référant au tableau d'équianalgésie ou en commençant par le plus petit dosage.
- > Ne pas oublier de prévoir des interdosages à action rapide au besoin.

De même, il ne faut pas oublier qu'après le retrait du patch, celui-ci reste encore actif durant 17 h.

Dans certaines situations (quand l'effet antalgique n'est plus suffisant après 48h), on peut être amené à remplacer le patch toutes les 48 h au lieu de 72 h. En réalité, le dosage du patch correspond au débit continu par heure. Cela signifie juste que le patch ne diffuse plus correctement car il n'adhère plus bien et que les molécules restent dans le patch. Il n'y a donc pas de risque de surdosage.

QUELQUES PRECISIONS

- > Il vaut mieux couper le patch en diagonale afin d'obtenir deux moitiés équivalentes !
- > !! Nécessité d'une peau saine et propre. Nettoyer la zone d'application avec de l'eau claire sans savon, crème, huile.
- > Si fièvre, transpiration, exposition soleil, affection cutanée -> Vérifier l'adhésion du patch.
- > Appliquer le patch, de préférence sur la partie haute du corps (bras, thorax, haut du dos). Appliquer sur un endroit lisse, non poilu. Couper éventuellement les poils à l'aide de ciseaux (! ne pas raser).
- > Lors de son placement, appuyer sur le patch avec la paume de la main durant 30 secondes afin d'optimiser son adhérence.
- > Le patch est résistant à l'eau, au bain. Eviter tout de même les bains prolongés.
- > Si le patch se décolle, le remplacer sans attendre car l'effet dépend de sa bonne adhésion.
- > Alternier l'application des patchs sur des endroits différents.
- > Le patch provoque moins de constipation que la Morphine (surtout l'Oxycodone) en comprimé ou en injection mais y être attentif malgré tout.

Buprénorphine (µg/h)	Fentanyl (µg/h)	Equivalence en dose Morphine (mg/24h)
	12,5	30
35	25	60
70	50	120
	75	180
140	100	240

→ Savez-vous que 1 patch de Durogésic 25 équivaut à 6 C° MS Direct sur la journée...